

Preparación para su endoscopia superior (EGD)

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES AL MENOS 7 DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO PARA EVITAR SER CANCELADO O REPROGRAMADO.

Política de no presentación/cancelación tardía:

Si necesita cancelar o reprogramar su procedimiento, le solicitamos que nos avise con al menos **3 días hábiles**. Nuestra oficina se reserva el derecho de cobrar **\$100** a los pacientes que no nos proporcionen la notificación adecuada al cancelar o reprogramar los procedimientos. Si necesita cancelar o reprogramar, llame a nuestra oficina directamente al 541-382-2811 o envíe una solicitud de cancelación de MyChart.

7+ días antes de su procedimiento:

- **CONTRATE UN CONDUCTOR:** Debe tener un adulto responsable que registre su salida y lo acompañe a casa siguiendo el procedimiento. No se le permitirá conducir usted mismo a casa.
- **REVISE LA LISTA DE MEDICAMENTOS DESCRIPDOS A CONTINUACIÓN QUE DEBEN CONSERVARSE Y CONTACTE AL PROVEEDOR QUE RECETA PARA OBTENER ORIENTACIÓN CUANDO SE INDIQUE**
- **PLANEE TOMARSE EL DÍA LIBRE EN EL TRABAJO/ESCUELA YA QUE EL TIEMPO DE SU PROCEDIMIENTO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS HASTA EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO**

EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

- **NO ALIMENTOS SÓLIDOS DESPUÉS DE LAS 8:00 PM – LÍQUIDOS CLAROS SÓLO HASTA SU PROCEDIMIENTO**
- Ejemplos de Líquidos Claros que puede tomar hasta 4 horas antes de su procedimiento:
 - o Caldo (hueso, pollo, ternera, verdura)
 - o Té o Café SIN nata ni azúcar
 - o Gelatina – no roja, naranja o morada
 - o Gatorade u otras bebidas con electrolitos (no rojas, naranjas ni moradas)
 - o Refresco transparente (ginger ale, Sprite, 7-Up)
 - o Paletas heladas – no rojas, naranjas o moradas
 - o Jugo de manzana, limonada, jugo de arándano blanco (sin pulpa)

EL DÍA DE SU PROCEDIMIENTO:

- Puede tomar líquidos claros hasta cuatro (4) horas antes de su procedimiento.
 - Nada por vía oral después de las 4 horas (es decir, nada de chicles, dulces, alimentos o líquidos)
-



PAUTAS PARA MANTENER MEDICAMENTOS

Comuníquese con su proveedor de recetas para obtener instrucciones sobre cómo suspender los siguientes medicamentos al menos entre 7 y 10 días antes de la fecha del procedimiento para evitar tener que cancelar o reprogramar. No deje de tomar estos medicamentos sin consultar primero con su proveedor.

- PLAVIX
- WARFARINA
- COUMADÍN
- ELIQUIS
- XARELTO
- BRILINTA
- EFICIENTE

Los siguientes medicamentos deben conservarse durante 7 días antes de su procedimiento:

- Inhibidores de GLP-1 (inyectables sin insulina) como:
 - o Ozempic/Wegovy (semaglutida)
 - o Trulicity (dulaglutida)
 - o Mounjaro (tirzepatida)
 - o Saxenda (liraglutida)
 - o Victoza (liraglutida)
 - o Byetta (exenatida)
 - o Bydureon Bcise (exenatida)
 - o Rybelsus (semaglutida oral)
- Fentermina
- Hierro
- Aceite de pescado
- Vitamina E
- Aspirina 325 mg: está bien continuar tomando 81 mg de aspirina para afecciones cardíacas.

Los siguientes medicamentos deben conservarse durante 3 o 4 días antes de sus procedimientos:

- Inhibidores de SGLT2 como:
 - o Jardiance (empagliflozina) 3 días de espera
 - o Invokana (canagliflozina) 3 días de espera
 - o Farxiga (dapagliflozina) durante 3 días
 - o Synjardy (empagliflozina/metform) retención de 3 días
 - o Steglatro (ertugliflozina) durante 4 días

El personal de enfermería prequirúrgico se comunicará con usted para analizar otros medicamentos que pueda estar tomando y brindarle instrucciones completas sobre cuándo y si debe suspenderlos.
